

Reduciendo el riesgo: Encuesta de conocimientos del alumno

Lee cada pregunta con cuidado y marca aquella respuesta que te parezca más acertada.

En esta encuesta se utilizan las siguientes palabras: **tener relaciones sexuales, ETS y VIH**. En esta encuesta,

- **tener relaciones sexuales** se refiere al coito sexual vaginal.
- **ETS** significa enfermedad/es de transmisión sexual. Algunos ejemplos de ETS son el herpes, la gonorrea, la sífilis, la clamidia y las verrugas genitales. A veces a estas enfermedades se les llama infecciones de transmisión sexual (ITS).
- **VIH** significa virus de inmunodeficiencia humana.

	<i>Cierto</i>	<i>Falso</i>	<i>No estoy seguro/a</i>
1. La mayoría de los alumnos de 14-18 años de edad tienen relaciones sexuales.	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃
2. Una mujer queda protegida contra el embarazo desde el primer día que empieza a tomar la píldora.	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃
3. Todas las ETS se curan tomando medicina.	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃
4. Una persona con una ETS, que se ve y se siente bien, no les puede pasar la infección a los demás.	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃
5. Algunas ETS aumentan el riesgo de que la persona contraiga VIH.	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃
6. Todos los años, como 1 de cada 4 adolescentes que tienen actividad sexual, contrae una ETS.	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃
7. La mejor manera de usar un condón es dejando un poco de espacio en la punta para el semen.	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃
8. Hay que desenrollar un condón completamente antes de colocarlo en el pene.	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃

	<i>Cierto</i>	<i>Falso</i>	<i>No estoy seguro/a</i>
9. La mayoría de las clínicas tienen que recibir el permiso de los padres para poder hacer análisis y dar tratamiento contra las ETS (entre ellas el VIH) a personas menores de 18 años.	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃
10. Las mujeres embarazadas que tienen infección por VIH le pueden pasar el virus al bebé antes de que nazca.	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃

11. ¿Te ponen en peligro de contraer VIH las siguientes conductas?	<i>Sí</i>	<i>No</i>	<i>No estoy seguro/a</i>
a. Usar las mismas agujas que alguien más para hacerte tatuajes u hoyitos	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃
b. Tener relaciones sexuales sin condón	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃
c. Donar sangre	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃
d. Usar el mismo condón dos veces	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃
e. Abrazar a alguien	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃

12. ¿Cuáles de los siguientes métodos son <u>eficaces</u> para proteger a la gente contra las ETS (entre ellas el VIH) y el embarazo, si se utilizan correctamente?	<i>Protege contra embarazo y ETS/VIH</i>	<i>Sólo protege contra embarazo</i>	<i>No protege</i>
a. Decidir no tener relaciones sexuales (abstinencia)	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃
b. Usar anticonceptivos de hormonas (como la píldora, inyección de Depo-Provera, parche, anillo vaginal)	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃
c. Usar condones de látex	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃
d. Retirar el pene	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃
e. Hacerse lavados vaginales	<input type="radio"/> ₁	<input type="radio"/> ₂	<input type="radio"/> ₃

Fin de la Encuesta de conocimientos